5 novembre 2026 - #143

à la Une



Circulation active de virus de la myxomatose chez le lièvre

- Circulation du virus HA-MYXV dans le 66 -

C'est un variant du virus de la myxomatose du Lapin. Il a recombiné avec un autre virus de la même famille (poxvirus) qui lui confèrent la capacité à infecter différentes espèces de lièvres tout en conservant la capacité à infecter le lapin.

👉 Plusieurs cas de mortalités anormales de lièvres ont récemment été observés sur différents secteurs de la plaine du Roussillon. Les analyses réalisées dans le cadre du *réseau SAGIR* ont mis en évidence la présence d'un *poxvirus* responsable de la myxomatose chez les animaux examinés.

👉 Face à cette situation sanitaire préoccupante, la Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées-Orientales souhaite attirer l'attention de tous les chasseurs sur la nécessité d'une vigilance renforcée quant à l'état des populations de lièvres présentes sur vos territoires.

- Surveillez attentivement l'évolution des effectifs de lièvres
- Signalez sans délai toute mortalité anormale ou tout animal présentant des signes cliniques suspects
- Évitez toute manipulation inutile des cadavres
- Sensibiliser les chasseurs de votre ACCA à cette situation afin de faciliter la détection précoce de nouveaux cas.

Préconisation de fermeture du lièvre sur les secteurs impactés

👉 Cette mesure de précaution apparaît aujourd'hui indispensable pour limiter la pression exercée sur une population fragilisée et favoriser le maintien de l'espèce dans les secteurs touchés.

👉 La situation sanitaire actuelle entre pleinement dans ce cadre exceptionnel et justifie la mise en œuvre rapide de mesures conservatoires adaptées.

👉 L'article 6, alinéa 58, des statuts des ACCA précise :
« Lorsque les circonstances d'urgence exceptionnelle l'imposent (type état d'urgence sanitaire), le Conseil d'administration, après validation par la FDC, peut prendre, à titre très exceptionnel, des décisions nécessaires à l'organisation de la chasse, et ce dans l'attente de validation par l'Assemblée générale qui suivra dans les meilleurs délais. »

👉 Les Conseils d'administration des ACCA de la plaine du Roussillon doivent se réunir dans les meilleurs délais afin de statuer sur cette proposition de fermeture et à informer la FDC66 de la décision prise.

Liste des communes ayant pris la décision de fermer la chasse du lièvre sur leur territoire

(liste non exhaustive, se renseigner auprès de son président d'ACCA)

- Baho
- Bouleternère
- Calce
- Claira
- Corbère-les-Cabanes
- Espira-de-l'Agly
- Llauro
- Le Soler
- Millas
- Montauriol
- Oms
- Peyrestortes
- Pézilla-la-Rivière
- Saint-Estève
- Saint-Féliu-d'Amont
- Saint-Féliu-d'Avall
- Saint-Jean-Lasseille
- Saint-Jean-Pla-de-Corts
- Salses-le-Château
- Tordères
- Villeneuve-de-la-Raho
- Vivès

Depuis quand et où circule la myxomatose du Lièvre ?

Les premiers cas de myxomatose du Lièvre en Europe ont été détectés en Espagne sur du Lièvre ibérique en 2018. Ils étaient répartis à l'origine principalement dans le sud et le centre du pays, puis dans toute l'aire de répartition du Lièvre ibérique (Lepus granatensis). Depuis 2023, de nombreux pays européens ont signalé des cas chez le Lièvre européen (Lepus europaeus) : Allemagne, Pays-Bas, Autriche, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie. La diffusion pourrait se faire aussi bien de proche en proche que par le biais d'échanges commerciaux.



Quels sont les signes cliniques ?

Les signes cliniques observés principalement chez le Lièvre ibérique sont une inflammation de la paupière avec gonflement, écoulement, conjonctivite, œdèmes des lèvres, des narines, génitaux, myxomes cutanés, amaigrissement. L'expression de cette maladie semble moins importante chez le Lièvre européen dont certains individus présentent peu, voire pas, de signes cliniques. La liste de ces signes reste à compléter en fonction des observations sur les épisodes en cours en France.



Comment se virus se propage-t-il dans les populations ?

La transmission de ce virus entre lièvres se fait par contacts directs et par le biais d'insectes piqueurs (on soupçonne que le rôle des moustiques, puces et autres insectes piqueurs, est important). Les cas présentent une forte saisonnalité avec un pic en fin d'été début d'automne et une disparition totale en hiver. Comme chez le lapin, les lièvres atteints peuvent être victimes de surinfections et porter d'autres agents pathogènes opportunistes (teigne par exemple).

Quel est son impact sur la dynamique de populations de Lièvre ibérique ? De Lièvre européen ?

L'impact est très fort sur les populations de Lièvre ibérique avec une mortalité de 55 à 70%. Il semblerait que les taux de mortalité locaux soient moins importants pour le lièvre européen que chez le Lièvre ibérique, mais cela reste à confirmer. L'impact a plus long terme dépend de différents facteurs dont l'abondance initiale de lièvres et les décisions de gestion qui sont prises (arrêt anticipé de la chasse). -Source FNC-

Ce virus ne peut pas infecter d'autres espèces que les lagomorphes.

Cependant, comme le virus de la myxomatose du Lapin, il entraîne une forte immunodépression. Les lièvres atteint peuvent donc être porteurs d'autres agents pathogènes pouvant infecter les chiens, voire l'Homme, comme la teigne.

Il est recommandé de ne pas laisser les chiens en contact avec des lièvres atteints et de les manipuler en respectant les consignes de biosécurité SAGIR de base (double paire de gants).

il est fortement recommandé de ne pas tirer les lièvres présentant des lésions. En effet un certain nombre d'entre eux peut guérir et accélérer l'immunisation de la population de Lièvre. Les femelles guéries transmettront des anticorps maternels aux levrauts et la circulation continue de ce virus permettra à ces levrauts, protégés par les anticorps maternels, d'acquérir une protection durable.

La Région Occitanie
Pyrénées - Méditerranée

PRÉSENTE







L'OCCITANIE
ELLE ME RESSEMBLE










MA RÉGION
ELLE NOUS RASSEMBLE







J'AI 10 ANS

Crédits : © SIOT & © Région Occitanie, © Sébastien Pauchant, © Stéphane Bansarkhani, © Laurent Boutonnet, © Léo Arcangeli, © Maxime Alexandrini

SUD MÉDITERRANÉE

GUASCH
Engagés depuis 1952

MONDIAL
PARE-BRISE

BLANCOM
COMMUNICATION EXTÉRIEURE Pyrénées MOBILIER URBAIN





PSL Revêtements et Sols
Mas des Granges • 1264. Tra Le Soler 66300 THUIR
Tél. : 06 61 41 76 46
psl.revetementsetsols@gmail.com



Fédération Départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales

Président
Jean-Pierre SANSON

Directeur
Jean-Roch CAZALS

fdc66@fdc66.fr

Nos soutiens historiques

FDC66 #143 - 5 novembre 2026